

## **Подготовка пациента для СЦИНТИГРАФИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ( $^{123}\text{I}$ -изотония).**

### ***При проведении исследования без наркоза:***

- ✓ необходимо прекратить прием медицинских препаратов, содержащих гормоны щитовидной железы (тироксин), с предварительной консультацией вашего лечащего врача/эндокринолога о возможности отмены препарата.
- ✓ отмена йодосодержащих препаратов за 3-4 недели до исследования.
- ✓ исключить прием йодосодержащих контрастных веществ используемых для других исследований (компьютерная томография).
- ✓ исключение из рациона йодосодержащих пищевых продуктов (все виды морепродуктов, яичные желтки, йодированную соль, водоросли, красная фасоль, цитрусы, виноград, яблоки, дыня, хурма, печень трески, морская рыба).
- ✓ для дезинфекции раневых поверхностей (при травмах) не использовать йодосодержащие препараты.
- ✓ голод за 4 часа до начала исследования.

### ***При проведении исследования под наркозом:***

- ✓ исключить прием пищи и любой жидкости за 6 часов до начала исследования (при грудном вскармливании за 4 часа).
- ✓ необходимо соблюдать вышеуказанные правила подготовки (как для пациентов без наркоза).